

Ooglidcorrectie

- Bovenooglidcorrectie
- Onderooglidcorrectie
- Medisch en cosmetisch

Ooglidcorrectie: beter zicht en een stralende blik

Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en de functie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. Bij het ouder worden verslappen de structuren in en onder de huid en kunnen de oogleden gaan hangen.

Dit kan er niet alleen toe leiden dat u een vermoeide blik krijgt, maar ook dat u functionele klachten ontwikkelt, zoals:


- Belemmering van het zicht
- Hoofdpijn
- Druk op de ogen
- Zware oogleden
- Rode, tranende ogen

Een ooglidcorrectie kan ervoor zorgen dat u weer een uitgeruste blik krijgt en dat u (deels) van de klachten af wordt geholpen. Maar ook wanneer er geen sprake is van klachten, kan een ooglidcorrectie wenselijk zijn. We spreken dan van een cosmetische ooglidcorrectie.

SOORTEN OOGLIDAFWIJKINGEN


- **Ooglidtumoren:** kunnen goedaardig zijn, zoals een chalazion of talgklierzwellling. Ook bestaan er kwaadaardige ooglidtumoren, zoals basaalcelcarcinoom.

- **Ptosis:** hangend bovenooglid, waarbij de ooglidrand naar beneden is geplaatst. De spier die het ooglid openhoudt is in dit geval niet goed ontwikkeld of uitgerekt. Kan verslechtering van het zicht als gevolg hebben. Meestal ontstaat het op latere leeftijd, maar kan aanwezig zijn vanaf de geboorte.



PTOSIS

- **Dermatochalasis:** overtollige huid in de bovenoogleden. Meest voorkomende afwijking aan de oogleden. Kan irritatie van de ogen en verslechtering van het zicht als gevolg hebben.
- **Ectropion:** naar buiten gedraaid onderooglid. Kan leiden tot rode, tranende ogen en ontstekingen. Komt vooral voor op oudere leeftijd.
- **Entropion:** naar binnen gedraaid onderooglid. Hierdoor kunnen wimpers tegen de oogbol komen en kleine beschadigingen veroorzaken aan het hoornvlies.



DERMATOCHALASIS

ECTROPION

ENTROPION


Behandeling

Ooglidtumoren

Afhankelijk van de oorzaak van de bultjes op de oogleden worden deze behandeld en mogelijk poliklinisch verwijderd.

Bovenooglidcorrectie

Bij een bovenooglidcorrectie kunnen hangende oogleden gecorrigeerd worden. Er wordt een sneetje gemaakt in de huidplooi, waarna de overtollige huid, eventueel gecombineerd met onderliggend spier en vetweefsel, wordt weggehaald. Uiteraard wordt gestreefd naar symmetrie. De wond wordt dusdanig gehecht dat het litteken in de huidplooi valt en nauwelijks zichtbaar is.



BOVENOOGLIDCORRECTIE

Onderooglidcorrectie

Bij een onderooglidcorrectie worden de entropion of ectropion gecorrigeerd. Om opvallende littekens te voorkomen, worden de lijntjes voor de operatie in de natuurlijke ooglidplooien getekend. Daarna wordt de huid van het ooglid verwijderd. Kleine bloedvaatjes worden dicht

gebrand en een eventuele uitpuiling van vet onder de huid wordt weggenomen. Voordat de huid wordt gesloten, wordt eerst zorgvuldig gecontroleerd op bloedingen. De huid wordt gesloten met een niet oplosbare hechting.

Is er alleen sprake van een vetoverschot, dan kan dit ook verwijderd worden via de binnenkant van het onderooglid. Hier wordt het slijmvlies geopend en het teveel aan vet verwijderd. De wond wordt na deze ingreep niet gehecht, maar sluit vanzelf.

VERGOEDING

Ooglidcorrecties die om functionele redenen worden uitgevoerd, worden vaak vergoed door de zorgverzekeraar. Wel dient deze vergoeding in sommige gevallen speciaal aangevraagd te worden. Operaties om cosmetische redenen worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Op www.eyescan.nl kunt u de prijzen vinden.



Meer informatie?

Kijk op www.eyescan.nl

Of bel 088 - 1111 900